

**BRONCOTOSIL®**

(Bromhexina)

Cápsulas

Mucolítico expectorante

**COMPOSICIÓN:**

BRONCOTOSIL CÁPSULAS BLANDAS: Bromhexina clorhidrato 8 mg, excipientes c.s.p.

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:**

Todas las formas de bronquitis, bronquitis enfisematosa y bronquiectasias.

Bronconeumopatías crónicas, neumoconiosis. Profilaxis de las complicaciones broncopulmonares postoperatorias.

Provocación de esputos para facilitar el diagnóstico citológico.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:****POSOLOGÍA**

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 cápsula cada 8 horas por 5 días consecutivos.

**CONTRAINDICACIONES:**

Antecedentes de intolerancia al principio activo. Úlcera gastroduodenal.

**RECOMENDACIONES:**

Precauciones: Embarazo y lactancia.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Efectos secundarios: Molestias gástricas.

Incompatibilidades: No se conocen.

Intoxicación y su tratamiento: Es prácticamente atóxico y no se han reportado casos de intoxicación.

**PRESENTACIÓN:**

**Presentaciones:** BRONCOTOSIL 8 mg, cápsulas blandas: Envase con 15 cápsulas.

Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó.

**LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.**

Quito: Lizardo García E1080 y

Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón.

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401

Correo Electrónico: [dmedica@bago.com.ec](mailto:dmedica@bago.com.ec)

[www.bago.com.ec](http://www.bago.com.ec)

