

Tenvalin®

SUSPENSIÓN ORAL ANTIPIRÉTICO – ANALGÉSICO

Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.
Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico.

Composición y presentación:

Tenvalin®: Cada 5 mL de suspensión contienen:
Ibuprofeno 100 mg
Excipientes c.s.

Tenvalin® Forte: Cada 5 mL de suspensión contienen:
Ibuprofeno 200 mg
Excipientes c.s.

Tenvalin® se presenta en frascos de 100 mL de suspensión oral.
Tenvalin® Forte se presenta en frascos de 100 mL de suspensión oral.

Recomendaciones de uso:

Tenvalin® y Tenvalin® Forte están indicados para el alivio de la fiebre en **pacientes mayores de 1 año**, y, en dolores leves a moderados tales como dolor de cabeza, musculares, articulares y de espalda.

Dosis y forma de administración:

Tenvalin®:

Niños de 2-12 años: La dosificación se debe realizar en base al peso corporal del niño.
En la siguiente tabla se especifican las dosis a administrar:

| Peso Corporal (Kg) | Edad (Años) | Temp. menor a 39°C | Temp. mayor a 39°C |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 11-16 | 2-3 | ½ cucharadita (2.5 mL) / 8 horas | 1 cucharadita (5.0 mL) / 8 horas |
| 17-26 | 4-8 | 1 cucharadita (5.0 mL) / 8 horas | 2 cucharaditas (10.0 mL) / 8 horas |
| 27-32 | 9-10 | 1½ cucharadita (7.5 mL) / 8 horas | 3 cucharaditas (15.0 mL) / 8 horas |
| Tenvalin® Forte: 33-43 | 11-12 | 2 cucharaditas (10 mL) / 8 horas | 4 cucharaditas (20.0 mL) / 8 horas |

Niños de 4-12 años: La dosificación se debe realizar en base al peso corporal del niño.
En la siguiente tabla se especifican las dosis a administrar:

| Peso Corporal (Kg) | Edad (Años) | Temp. menor a 39°C | Temp. mayor a 39°C |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 17-26 | 4-8 | ½ cucharadita (2.5 mL) / 8 horas | 1 cucharadita (5.0 mL) / 8 horas |
| 27-32 | 9-10 | 1 cucharadita (5.0 mL) / 8 horas | 2 cucharaditas (10.0 mL) / 8 horas |
| 33-43 | 11-12 | 1½ cucharadita (7.5 mL) / 8 horas | 3 cucharaditas (15.0 mL) / 8 horas |
| Adultos | Mayor de 13 años y Adultos | 2 cucharaditas (10 mL) / 8 horas | 4 cucharaditas (20 mL) / 8 horas |

No administrar dosis superiores a las recomendadas.

Agitar bien antes de usar.

Administrar junto con las comidas o con un vaso de leche.

La duración del tratamiento no debe exceder los 3 días en caso de fiebre y los 10 días para el tratamiento del dolor. Si la fiebre o el dolor persisten después de estos periodos o aparecen otros síntomas, consulte a su médico.

Precauciones y advertencias:

No administrar a niños menores de 1 año.

Si el niño va a ser sometido a una intervención quirúrgica informe al médico u odontólogo que está tomando este medicamento.

Administrar con precaución en pacientes con enfermedad renal o hepática.

Interacciones:

Los efectos de un medicamento pueden modificarse cuando se administra junto con otros.

Usted debe comunicar a su médico todos los medicamentos que está tomando antes de iniciar la terapia con Tenvalin® y Tenvalin® Forte.

No administrar conjuntamente con otros productos que contengan Ibuprofeno, Acido Acetil-salicílico, otros antiinflamatorios no esteroideos, Hidantoínas, Anticoagulantes, Sulfonilúreas, Furosemida, Glucósidos cardíacos, Propranolol, Probenecid, Metotrexato, Inhibidores ECA, Antimicóticos, Sales de Litio, Fenitoína, sin indicación médica.

Efectos adversos:

Todo medicamento puede causar junto con los efectos benéficos deseados, algunos efectos secundarios. La posibilidad de presentar efectos secundarios con el uso de Tenvalin® y Tenvalin® Forte en las dosis recomendadas es muy baja, sin embargo, se puede presentar efectos no deseados especialmente si se toman por un período prolongado de tiempo y/o en dosis altas.

Si aparece cualquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al médico: alergia (picazón y enrojecimiento de la piel, hinchazón de la cara o alrededor de los ojos, molestias al respirar, fiebre o dolor de garganta), deposiciones negras o con sangre, malestar abdominal, dolor epigástrico.

Sobredosis:

Si sospecha de una intoxicación o sobredosis, habiendo o no síntomas, usted debe trasladar al paciente a un Centro Asistencial cuanto antes.

Condiciones de Almacenamiento:

Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar protegido del calor, a no más de 30° C. No refrigerar.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.



Elaborado por Laboratorio Bagó de Chile S.A.
Av. Vicuña Mackenna 1835, Santiago-Chile.
Director Técnico: Alfredo Guevara Z., Químico Farmacéutico.
Importado y distribuido por Laboratorios Bagó del Ecuador S.A.,
Quito-Ecuador

714701-001